

Escala del cuidado y condición del animal de Tufts (TACC) para valoración de la condición corporal, cuidado físico, del ambiente y el entorno en perros

JUAN M^ª JOSA MUTUBERRÍA

Col. 2675.CV Vetpa. Madrid.c.vetpa@gmail.com

La actuación veterinaria ante el maltrato animal si bien es un deber que tenemos los veterinarios, es una faceta que exige entre otros componentes, una formación y sistematización adecuada. Tenemos que recordar que nuestro principal objetivo es mejorar el bienestar de los animales, y al mismo tiempo preservar las pruebas que pudieran ser necesarias para evidenciar la situación de maltrato, pruebas que deben intentar reflejar de forma coherente la situación con el fin de en caso de ser necesario se puedan instruir los procedimientos judiciales pertinentes.

Con el dicho fin de documentar de forma fehaciente el estado de los animales se precisa registrar tanto la situación ambiental como la individual. La situación individual solemos en el caso de la práctica clínica habitual reflejarla en informes

que si bien pueden tener sus peculiaridades en los casos de maltrato es una práctica que podríamos considerar habitual y conocida.

PATRONES DE REFERENCIA

En el caso de colectividades de animales, originariamente se ideó en relación a los casos de atesoramiento(6)(7), pero se puede emplear igualmente en casos de criaderos o reales, la tabla TACC (Tufts Animal Care and Condition) o de Tuft's para perros tiene por fin el sistematizar dicha recolección de datos respecto a los animales hallados, y tener unos patrones fijos de referencia, donde también se valora las condiciones ambientales del entorno, dando un valor numérico que orienta sobre el grado de falta de bienestar.

La tabla de Tuft's está concebida para perros, el empleo en otras

especies como los gatos, debe tener en cuenta que tanto las necesidades de espacio o de temperatura son diferentes, se han sugerido parámetros propios en el caso de las casas con muchos gatos (4), en el caso de los grandes animales tenemos las mismas limitaciones, pudiéndose usar para valorar la condición corporal la tabla de Henneke (2).

Este tipo de recursos no entra a describir específicamente posibles afecciones esporádicas o infecciosas, ni tampoco entran en la valoración de la actitud del responsable de los animales, por ejemplo dentro de los tipos de atesoradores se distinguen; cuidadores sobrepasados, rescatadores compulsivos y abusadores (3), lo cual tiene su interés en relación no del componente de maltrato hacia los animales sino el componente de crueldad.

En otros tipos de maltrato (5), como los que se podrían observar en el curso de la práctica clínica habitual, los debidos a causas no accidentales, la mayoría de las veces no conocemos el entorno, con lo cual esta tabla pierde parte de su utilidad.

La actuación veterinaria ante el maltrato animal si bien es un deber que tenemos los veterinarios, es una faceta que exige entre otros componentes, una formación y sistematización adecuada

ESCALA DE CUIDADO Y CONDICIÓN DEL ANIMAL, EN PERROS, DE TUFTS, (TACC) PARA VALORACIÓN DE LA CONDICIÓN CORPORAL, CUIDADO FÍSICO, DEL AMBIENTE Y DEL ENTORNO*

* Patronek, G.J. In: Recognizing and reporting animal abuse, a veterinarian guide. Denver. CO: American Humane Association. 1997.

I. Escala de condición corporal (la palpación es esencial para perros de pelo largo, debe considerarse el aspecto característico de cada raza)




Escala de condición corporal adaptada de Laflamme, DP. Proc. N.A. Vet Conf 1993, 290-291; and Armstrong, PJ Lund EM. Vet Clin Nutr 3:83-87;1996. Diseño de Erik Petersen.

II. Escala de protección respecto al clima

Leer la puntuación según las diagonales

Considerar el tamaño del perro



En clima húmedo o cálido

- Restar 1 punto si hay agua disponible
- Restar 1 punto si el perro está situado en una zona sombreada
- Añadir 1 punto si el perro es braquicefálico
- Añadir 1 punto si el perro es obeso

En clima frío o templado

- Añadir 1 punto si es un perro miniatura
- Añadir un punto si el perro está bajo la lluvia o ventisca
- Restar 1 punto si es un perro nórdico o con grapa gruesa
- Restar 1 punto si el perro tiene refugio adecuado y buena cama
- Restar 1 punto si el animal ha sido aclimatado a frías temperaturas

En todas las condiciones climáticas

- Añadir un punto si el perro es menor de 6 meses de edad

Para determinar la puntuación, trazar una línea desde la temperatura registrada y paralela a la línea de puntos y leer puntuación. Se debe usar teniendo en cuenta la duración de la exposición a determinadas temperaturas, periodos cortos de calor pueden ser muy peligrosos, mientras que espacios de tiempo similares con temperaturas frías pueden no ser tan graves.

III. Escala de salud ambiental

5. Inmundo

Muchos días o semanas de acumulación de heces o/y orina, olor nauseabundo, aire difícil de respirar. Cantidad importante de desechos, basuras o restos; no hay posibilidad de posiciones normales de descanso o el movimiento sin riesgo para el animal. El animal no puede evitar el contacto con heces, orina, barro o el agua estancada. Comida o/y bebida contaminada.

4. Muy insalubre

Muchos días de acumulación de heces o/y orina. Dificultad del animal para evitar el contacto con la basura. Cantidad moderada de desechos puede dificultar el descanso o el movimiento del animal. Posibilidad de daños por los bordes cortantes o cristales, Olores fuertes que se perciben como desagradables. Dificultad para evitar el agua estancada.

3. Insalubre

Varios días de acumulación de heces u/y orina en el entorno del animal. El animal es capaz de evitar el contacto con los desechos. Las basuras y otros restos no impiden el descanso normal del animal, el acumulo de objetos puede llegar a interferir el movimiento normal del perro o que este se quede atrapado, pero no hay bordes cortantes ni cristales. El animal es capaz de evitar el barro y el agua presentes.

2. Deficiente

Como en #1, pero menos salubre. Acumulación de heces menos de dos días en el entorno del animal, puede haber cierto desorden.

1. Aceptable

Entorno seco y libre de deposiciones. Ni la comida ni el agua están sucias. No hay escombros ni basura desordenando el entorno. El animal puede descansar, mantener una posición normal y libertad de movimientos sin peligro de dañarse o quedarse atrapado.

<Entorno>

Se refiere al espacio donde el animal está confinado o pasa la mayor parte de su tiempo: jaula, chenil, terreno, habitación, espacio donde está atado u otro similar. No es necesario que se presenten todas las condiciones para incluir al animal en una categoría determinada. El usuario debe determinar que categoría es la que mejor describe la condición particular en que se encuentra el animal.

INTERPRETACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN TACC DE LAS ESCALAS I-IV:

La clasificación del cuidado y condición del animal de Tufts (TACC) se asigna en función de los puntos obtenidos en cada una de las escalas de **Condición corporal y protección respecto al clima, Salubridad del entorno y Cuidado físico**. Si se evalúan diferentes escalas, la puntuación mayor de cualquier escala debe ser usada para calificarla

Score	Condición corporal, cuidado físico, escala de salud	Escala de salubridad respecto al clima
>5	Severa negligencia y trato inhumano, situación urgente que justifica una respuesta activa para proteger al animal.	Situación de riesgo inmediato para la vida del animal. Requiere intervención inmediata para disminuir el riesgo para el animal (proporcionar refugio, agua).
4	Clara evidencia de seria negligencia o/y trata inhumano (a menos que haya una condición médica que justifique la condición corporal), requiere una rápida mejora.	Situación peligrosa produciéndose, requiere intervención rápida para disminuir riesgo (proporcionar refugio, agua, sombra). Advertir al propietario de los riesgos y necesidades de refugio.
3	Negligencia presente, mejorar adecuadamente y/o control periódico puede ser necesario.	Indicadores de una situación potencialmente insegura, dependiendo de la raza, o el tiempo de exposición al exterior. Informar al propietario del riesgo y de las necesidades de refugio adecuado.
2	Una falta de cuidado puede estar presente. Evaluar y comentar con el propietario, recomendar si es necesario cambios en el manejo.	Riesgo improbable, pero evaluar la situación, para garantizar un correcto cuidado, comentar tus dudas y condiciones para un refugio adecuado con el propietario.
≤1	No hay evidencia de negligencia.	No hay evidencia de negligencia.

Advertencia: La clasificación TACC tiene por objetivo ser un útil sencillo para valorar cuando puede haber negligencia, para priorizar la investigación de los casos de crueldad animal, y como recurso para sistematizar dichas experiencias. La clasificación TACC no intenta reemplazar una valoración definitiva por parte del veterinario o de la autoridad. Una puntuación baja no excluye un diagnóstico de abuso, negligencia o demanda de cuidado veterinario en función de un adecuado examen del animal y de su entorno.

IV. Escala de cuidado físico

5. Pésimo

Capa extremadamente deteriorada, que dificulta el movimiento, interfiere con la visión. Zona perineal con escaras o irritada por la orina y las heces. Capa de pelo a modo de vellón. El perro no se puede cepillar sin un rasurado completo. Objetos foráneos en la capa de pelo. Uñas extremadamente largas o enroscadas, que pueden llegar a penetrar en las almohadillas, causando posición anormal del pie y dificultando o haciendo molesto el paso normal. La cadena o la correa, si están presentes pueden llegar a estar incrustados en el cuello del animal.

4. Malo

Jirones de pelo abundantes en la capa, trozos grandes de pelo unidos que no pueden ser separados con una cepillo o un peine. Cuerpos extraños ocasionales en la capa. Se necesita cortar gran cantidad de pelo para remover los mechones de pelo. Uñas largas que fuerzan la posición del pie e interfieren con la marcha normal. Posibilidad de irritación o escara perineal. Collar o cadena, si están presentes, pueden estar muy apretados, erosionando la piel.

3. En el límite

Numerosos mechones en la capa, pero el perro aún se puede cepillar sin necesidad de un corte extenso de pelo. Zona perineal sin probabilidad de irritación por los jirones sucios de pelo. Las uñas necesitan cortarse y son lo suficientemente largas para alterar el paso cuando el animal anda. El collar o la cadena, si están presentes, pueden estar ajustados y enredarse con el pelo del cuello.

2. Dejado

La capa puede tener alguna suciedad o tener nudos fáciles de arreglar. El resto del pelo se puede cepillar o peinar, las uñas necesitan un corte. El collar o la cadena, si están presentes, se ajustan adecuadamente.

1. Adecuado

El perro está limpio, pelo de normal longitud para su raza, y se puede cepillar fácilmente o peinar, las uñas no tocan el suelo o apenas lo hacen. El collar o la cadena, si están presentes, se ajustan adecuadamente.

No es necesario que estén presentes todas las condiciones listadas para incluir al perro en una categoría determinada. El usuario debe determinar que categoría describe mejor la condición particular del animal. Esta escala no es significativa para valoración de condiciones médicas: una extremidad rota, claramente indica la necesidad de atención veterinaria.

En ningún caso esta tabla restringe la utilidad del examen veterinario habitual, y sirve de complemento para reflejar la situación del animal con vistas a posteriores acciones administrativas o judiciales.

El uso de documentos en procedimientos legales exige que este en

castellano u otra de las lenguas oficiales, y si no fuera así se precisaría una traducción (1). Esta necesidad, así como la comodidad para que el veterinario emplee este recurso en su lengua, incluyendo el empleo de las medidas de temperatura por grados Celsius frente a la escala Fahrenheit

o de las medidas métricas frente a las imperiales, es lo que motiva esta traducción de la tabla al castellano.

AGRADECIMIENTOS

Al Dr. G. Patronek por considerar necesaria y útil esta transcripción. 🇺🇸

REFERENCIAS

1. BOE.es - Documento consolidado BOE-A-2000-323 [Internet]. [citado 5 de enero de 2021]. Disponible en: <https://www.boe.es/eli/es/l/2000/01/07/1/con>
2. Henneke DR, Potter GD, Kreider JL, Yestaes BF. Relationship between condition score, physical measurements and body fat percentage in mares. *Equine Veterinary Journal*. 1 de octubre de 1983;15(4):371-2.
3. Frost RO, Patronek G, Arluke A, Stekette G. The Hoarding of Animals: An Update. *Psychiatric Times* [Internet]. 2015 [citado 5 de enero de 2021];32(4). Disponible en: <https://www.psychiatrictimes.com/view/hoarding-animals-update>
4. Hill K, Yates D, Dean R, Stavisky J. A novel approach to welfare interventions in problem multi-cat households. *BMC Vet Res* [Internet]. 3 de diciembre de 2019 [citado 5 de enero de 2021];15. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6891977/>
5. Munro HMC, Thrusfield MV. Battered pets': non-accidental physical injuries found in dogs and cats. *Journal of Small Animal Practice*. 2001;42(6):279-90.
6. Patronek GJ. Hoarding of animals: an under-recognized public health problem in a difficult-to-study population. *Public Health Rep*. febrero de 1999;114(1):81-7.
7. Hoarding of Animals Research Consortium [Internet]. Cummings School of Veterinary Medicine at Tufts University. [citado 22 de junio de 2018]. Disponible en: <http://vet.tufts.edu/hoarding/>